

DIFESA GUIDATA VITE
BOLLETTINO FITOSANITARIO N.6 DEL 24.05.017- PERUGIA E TERNI

Fase fenologica : Pre-fioritura- Fioritura- Inizio allegagione

PERONOSPORA

Segnalazione di presenza di peronospora a fine passata settimana a Monte falco e Bevagna in conseguenza infezione primaria verificatasi dal 06 al 08 maggio.

Possibili infezioni secondarie in presenza di prolungate bagnature .

In previsione di possibili piogge si consiglia di assicurare la copertura antiperonosporica, con prodotti endoterapici quali cymoxanil, CAA (mandipropamide, dimetomorph, valiphenalate, benthiovalicarb, iprovalicarb) , Fenilammidi (metalaxil, metalaxil-m. benalaxil, benalaxil-M), Fluopicolide, associati a prodotti di copertura oppure le altre s.a. presenti nel disciplinare di difesa integrata (ametoctradina, amisulbrom, cyazofamide ecc) in funzione della persistenza delle s.a. utilizzate nel precedente trattamento fitosanitario.

OIDIO

Abbinare al trattamento antiperonosporico zolfi bagnabili, meptildinocap, spiroxamina, Bupirimate, IBE ecc....

L' Ispettore fitosanitario
(Dr Agr Giovanni Natalini)

Regione Umbria
Servizio Innovazione, Promozione, Irrigazione, Zootecnia e Fitosanitario

Il Dirigente
~~Dr Giuliano Polenzani~~