



Piena fioritura - Il 50% dei fiori sono aperti (caliptré cadute). L'ovario resta nudo fino a quando i 5 stami si diffondono a raggiera intorno lui.



Fine fioritura - Fioritura in fase finale, la maggior parte delle caliptré sono cadute.

FASE FENOLOGICA

**Piena fioritura (BBCH 65);
Allegagione (BBCH 71);
Sviluppo degli acini (BBCH 73)**

(Fonte: *reterurale*, *ERSA* – *Baggiolini*)

Previsioni meteo: Oggi prevista residua instabilità pomeridiana nella zona meridionale. Tempo in miglioramento.

PERONOSPORA

Presenza di sporadiche macchie di peronospora nella zona di Narni, Calvi, Baschi, Orvieto, Bettona.

In presenza di eventuali prolungate bagnature intervenire preferibilmente con ametoctradina, amisulbrom, ecc. privilegiando il rame dove si è verificata l'allegagione.

OIDIO

In assenza di copertura antioidica intervenire con IBE, Metrafenone, Cyflufenamide, zolfi bagnabili ecc.

Le s.a. utilizzabili sono riportate nel relativo disciplinare di difesa integrata della Regione Umbria valido per l'annata 2020 -2021 (valido per coloro che aderiscono alle misure agroambientali).

Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa della vite sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari>

I bollettini fitosanitari per la coltura della vite vengono redatti sulla base dei Disciplinari di Difesa Integrata 2020/2021, scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>