



(Fonte: Servizio fitosanitario regionale)

FASE FENOLOGICA

Grappoli nettamente visibili (BBCH 53)
Grappoli separati (BBCH 55)
Bottoni fiorali separati (BBCH 57)
Inizio fioritura (BBCH 62)

Tendenza: Spiccata instabilità nel fine settimana con la possibilità di rovesci o temporali, soprattutto nella giornata di domenica. <http://www.cfumbria.it/index.php?s=29>

In base ai dati pervenuti dalla rete di monitoraggio regionale sugli areali TRASIMENO, PERUGINO-TORGIANO, ALTO TEVERE, MONTEFALCO, ORVIETO-NARNI, si rappresenta la seguente situazione:

PERONOSPORA

Assenza di sintomi nelle aziende monitorate. Situazione di basso rischio in base ai dati dei modelli previsionali.

In assenza di copertura antiperonosporica, in previsione di peggioramento del tempo nel fine settimana, si consiglia di intervenire con prodotti preferibilmente endoterapici quali CAA (Dimetomorf, Mandipropamide, Valiphenalate, Benthiovalicarb, Iprovalicarb), Metalaxil- m, etc., abbinati a prodotti di copertura.

OIDIO

Assenza di sintomi nei punti monitorati. Situazione di alto rischio in base ai dati dei modelli previsionali.

In assenza di copertura antioidica abbinare al trattamento antiperonosporico spiroxamina, meptildinocap, IBE, et.

Le s.a. utilizzabili sono riportate nel relativo disciplinare di difesa integrata della Regione Umbria valido per l'annata 2021 -2022 (valido per coloro che aderiscono alle misure agroambientali). <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>

Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa della vite sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: [http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini fitosanitari](http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari)